

Checklist voorkomen van bijtgedrag:

- **Omgevingstemperatuur**
 - bij spenen 30 graden
 - bij opleg 24 graden
 - klimaatcontrole minimaal 1x per jaar

- **Voldoende ruimte**
Biggen en vleesvarkens opleggen volgens de normen (gespeende biggen 0,3m²/big) en liever nog ruimer.

- **Voldoende eetplaatsen**
 - Biggen eerste 2 dagen na spenen; 1 eetplaats voor max. 2 biggen, goed verdeeld.
 - Biggen vanaf 4 dagen na spenen tot opleg: 1 eetplaats (in de vorm van ronde bakken) voor 5 biggen. De voerbak biggen mag niet langer dan 30 minuten leeg zijn. Ze eten 10-12 keer per dag en 3-7 gram per minuut.
 - Vleesvarkens: 1 eetplaats voor maximaal 8 vleesvarkens. Ze eten 8 -12 keer per dag en 40 gram per minuut.
 - Brijvoer: 1 eetplaats per dier.

- **Voldoende drinkplaatsen**
 - Biggen eerste 2 dagen na spenen; 1 drinkplaats voor 5 biggen, goed verdeeld.
 - Biggen vanaf 4 dagen na spenen tot opleg: 1 drinkplaats voor 10 biggen.
 - Vleesvarkens: 1 drinkplaats voor maximaal 10 vleesvarkens.
 - Brijvoer: 1 nippel per 12 varkens.

- **Voldoende nippelopbrengst**
 - Bij biggen: minimaal 500-700 ml per minuut
 - Bij vleesvarkens: minimaal 800 ml per minuut
 - Watercontrole minimaal 4x per jaar

- **Aanvullingen via de voeding**
 - Magnesiumoxide
 - Tryptofaan
 - Zout
 - Ruwe celstof

- **Hokverrijking**
Voldoende afleidingsmateriaal (bedrijfs- en hokafhankelijk).

- **Logische hokindeling**
Met drie functiegebieden (eten en drinken/ slapen/ poepen en plassen)

- **Luzerne**
1 keer per dag een handje luzerne geven per hok (goed voor afleiding en sociale interactie).

- **Sluit ziekte uit**
 - Hebben ze een normale lichaamstemperatuur (boven de 39,5 graden is koorts).
 - Voorkom ziektes door juiste diagnose stelling en behandeling samen met uw Oosthof dierenarts.



Afbeelding 4 Afleidingsmateriaal, E. Tijs